

—ours

Observations sur Les accouchemens
par M. Enjoubert chir. à Arras.

Ce n'est pas toujours le Manuel des accouchemens qui
constitue l'accoucheur. La Connoissance du Mechanisme
uterin est encore d'une si grande utilité que son ignorance
conduit souvent le simple operateur dans un detail de fautes
impardonnable. L'inertie par exemple ou tombe quelquefois
la Matrice apres le coulement des eaux, est un état qui, si
il n'est pas connu, determine souvent à recourir à des Moyens
souvent meurtriers et toujours imprudens.

Soit que l'accouchement soit prématuré, soit qu'il arrive à
son terme, la Matrice observe toujours la même Marche
pour se débarasser des Corps qui la tiennent passivement
dilatés; Elle agit plus ou moins efficacement suivant son
Degré d'élasticité, ou suivant quelle est plus ou moins
solicitée par les Corps qu'elle renferme. Le principe
quoiqu'il en soit n'est pas adre Médit, et ce n'est qu'après
avoir été le triste témoin ou son ignorance conduit, que
je me determine à rapporter quelques observations relatives
à cet objet: puissent les fautes d'autrui servir à
nous instruire.

La Matrice est un muscle creux qui tend toujours à la
contraction des qu'il trouve le moindre vuide dans sa
Cavité, mais cette contraction est plus ou moins vive
suivant les Circonstances; Dans une grossesse avec hydropsie
par exemple, apres l'evacuation des eaux les contractions
sont plus ou moins actives suivant l'extension plus ou moins
grande des fibres, ou suivant que l'eau aura séjourné
plus ou moins long temps. il est facile de concevoir que
plus l'extension des fibres aura été grande, et plus elles
auront été abreuvées par le séjour des eaux surabondantes,
plus il faudra de temps aux parois uterines à se replier

sur eux mêmes avant de pouvoir agir sur les Corps renfermés.
Dans un accouchement prématuré, Comme au terme de quatre
à Cinq Mois, la quantité des Eaux a souvent porté la Matrice
à un degré d'extension énorme, Et le fœtus n'a pas acquis un
accroissement Conforme à son terme, & lors si les Eaux s'écoulent,
la Matrice tombe dans une vacuité ou l'état d'inertie La
laisse plus ou moins croupir, Mais lors que l'élasticité Commence
à exercer son action Contractive, les parois utérines Commencent
à se replier sur eux mêmes, Mais les Contractions alternatives
qui se manifestent par des Douleurs momentanées n'agissent
pas d'abord sur les Corps renfermés, ni n'opèrent pas sur
la dilatation de l'orifice; Ce n'est quelquefois que Cinq à six
jours après l'évacuation des Eaux, que les parois de la
matrice se tant repliés sur eux mêmes Comment à agir
efficacement sur le fœtus, qui alors étant Comme bloqué
sur l'orifice le force à se dilater pour lui permettre le passage.
Ce Mécanisme est la partie l'objet de Mon Exposé, Et
Ce n'est que pour le mieux faire Connoître que je vais
rapporter quelques observations relatives.

III^e observation

une femme âgée d'environ trente ans, ayant eu trois accouchements
heureux, fut atteinte d'une fièvre intermittente des le
Commencement de la quatrième grossesse; au terme de Cinq-
mois il se manifesta des douleurs utérines qui furent suivies
d'une quantité d'eau assez abondante pour faire soupçonner
une hydropisie de Matrice avec grossesse. Dès que les Eaux
furent évacuées la Matrice se replia sur elle même par des
Contractions très lentes, mais douloureuses, le Chirurgien
appelé au Secour de cette femme en pratiquant le toucher
reconnut que l'orifice de la Matrice étoit dilaté de la
largeur d'une pièce de deux sols, ayant introduit le doigt

Dans cet orifice, il sentit les membres d'un fœtus qui lui parut très mobile, peu versé dans l'art des accouchemens, il opéra une prompte délivrance, mais quatre jours s'étant écoulés sans qu'il apportât d'augmentation dans la dilatation de l'orifice, ni de progression de l'apart du fœtus, il ne put se rendre raison d'un pareil retardement; Et on appela en consultation deux Médecins & deux Chirurgiens, une partie des Consultants proposa de tenter par degrés la dilatation de l'orifice, mais l'opérateur ne pouvant y parvenir comme on lui avoit fait opérer, fit une manœuvre si inconsiderée qu'il dévota en partie la matrice d'avec le vagin; Cet accident ayant été reconnu on abandonna la femme à son malheureux sort, Le sixième jour depuis l'événement des larmes, malgré l'inflammation qui suivit la rupture du vagin, la Matrice expulsa spontanément un fœtus en double dont le volume étoit à-peu-près semblable à un fœtus, la Malade ne survécut que quatre à cinq jours à cet accident.....

Cette observation me paroit de nature à mettre la évidence Les principes que j'ai exposé dans mon préambule, & l'observation suivante ayant beaucoup de rapport à la précédente ne fait que la corroborer

2^e observation

une femme âgée d'environ trente ans ayant eu plusieurs fausses couches au termes de quatre à cinq mois de grossesse, fut atteinte, environ le cinquième mois d'une de ses grossesses, de douleurs si violentes que les larmes contenues dans la Matrice s'évacuèrent, suivant le rapport de la femme il s'écoula plus de quatre pots d'eau... après cette évacuation la Matrice tomba dans une inertie si grande que les Contractions parurent cessées, & que la Malade se crut débarrassée d'une simple hydropsie de Matrice; Mais vingt quatre heures



Les parois de la matrice commençant à se replier sur
eux mêmes, il se déclara des douleurs assez vives, qui
étoient encore suivies de l'écoulement de quelques jets d'eau,
la malade souffrit cet état pendant trois jours, mais
ressentant toujours des douleurs très aiguës. Elle m'envoya
chercher; En pratiquant le toucher je trouvai l'orifice de
la Matrice dilaté à ne permettre que l'introduction du
doigt, je reconnus la présence d'un fœtus vaillant; pour
mieux sentir de l'efficacité des douleurs sur le Corps, Contenant
je restai le doigt introduit dans l'orifice, jus qu'à ce qu'il se
fût déclaré une forte, quoique la douleur fût très sensible
le fœtus ne prouva pas le moindre mouvement, & l'orifice
ne parut rester dans le même état; je jugeai que les
douleurs n'étoient que les effets des Contractions des
parois de la Matrice qui ne faisoient encore que de
se replier sur eux mêmes, la femme resta encore trois
jours dans le même état, & ce ne fut que le sixième
jours depuis l'écoulement des eaux, que les parois de la
matrice se tant assez recueillies commençant à agir
sur le fœtus, qui étant poussé sur l'orifice l'obligea de
se dilater au point de permettre la sortie du fœtus
dont le volume doit égal à celui de l'observation
précédente.

Après avoir exposé par l'observation le Mécanisme utérin.
dans les grossesses avec indolence, aux termes prématurés,
je crois qu'il faut mieux être spectateur oisif qu'opérateur
imprudent.

Si dans l'accouchement prématuré il est plus prudent
de Confier à la nature le soin de se débarrasser, il est
encore très prudent de prendre ce parti dans l'accouchement
à terme, lors qu'il n'est retardé que par l'inertie —

Des fibres uterines, l'observation suivante en est une
preuve

3^{me} observation

une femme âgée de vingt huit ans d'une Constitution
molle & lâche, ressentit au terme de neuf mois de grossesse,
une foible douleur dans les reins qui fut suivie de l'écoulement
des eaux. Cette femme grosse pour la première fois fut
effrayée à cette apparition & envoya chercher son Chirurgien;
il ne s'écoula pas assez d'eau pour faire soupçonner
l'hydropisie; le chirurgien ayant pratiqué le toucher, trouva
l'orifice de la Matrice très peu dilaté, & la tête de l'enfant
appuyée dessus; En conséquence de ces dispositions il opera
un prompt accouchement, Mais les douleurs n'étant que
foibles & éloignées il fut trompé dans son attente, —
Cinq jours se passerent sans que l'orifice augmentât de
diamètre, Ce ne fut qu'à cet époque qu'il commença à
se dilater & que la tête de l'enfant commença à s'engager
dans le détroit supérieur du bassin, mais l'engagement de
la tête ne se faisant que très lentement, le chirurgien
crut que le volume de la tête étoit l'obstacle à sa progression
& proposa l'usage du forceps pour accélérer l'accouchement;
la Malade effrayée à cette proposition m'envoya chercher,
mais ne pouvant me rendre que le sixième jour depuis
l'écoulement des eaux, le chirurgien toujours préoccupé de
son système le fit adopter à la malade, mais l'enfant n'étant
pas encore favorablement engagé pour être soumis
au jeu de cet instrument, le forceps fut appliqué
infructueusement. Dès que je fus arrivé le
Chirurgien ne manqua pas de me prouver de son
sentiment, mais que l'atonie des fibres uterines pour
Cause du retardement, En effet la femme étoit bien



Conformée; n'ayant qu'un travail languissant, on ne
pouvoit soupçonner d'autre cause de retardement que l'inertie
de la fibre, En conséquence j'eus conseil d'abandonner l'accouchement
à la nature, & de soutenir la Malade par un régime Cordial;
Le huitième jour l'accouchement se termina par la seule
force de la nature.

Cette observation quoique très simple en elle-même, & quoiqu'elle
fréquente est pourtant très propre à démontrer de plus en
plus les effets du relâchement, & qu'il n'est pas toujours
besoin de recourir à des moyens étrangers: C'est à
l'accoucheur à avoir plutôt égard à la nature des
douleurs, qu'à la longueur du temps du travail, qui
pour l'ordinaire devient plus efficace à mesure que
l'enfant s'en va davantage.

2^e observation

Si l'Hydropisie de la Matrice dans la grossesse
porte une grande inertie dans les fibres de ce
viscère, elle peut encore occasionner un renversement
partial de ses parois.

La femme d'un Marchand de cette ville ayant eu
plusieurs accouchemens heureux, à l'âge d'environ trente
huit ans devint enceinte; sa grossesse fut accompagnée
d'une paleur extrême. au terme de six mois, n'ayant
ressenti aucun mouvement de son enfant, sentit des
doux scouler sans douleur, la Malade envoya chercher
sa Matrone, qui pratiquant le toucher trouva dans
le vagin un repli des parois du fond de la Matrice
qui se bloient précipités à travers son Col, la Matrone
prit ce prolongement des parois utérines pour une molle,
et En conséquence fit plusieurs tiraillemens pour en
faire l'extraction, pour tout fruit de ses tiraillemens

Elle occasionna des douleurs qui firent pousser des cris
à la Malade qui m'envoya chercher; Des que j'eus pratiqué
le toucher je n'eus pas de peine à reconnaître que le
prolongement utérin étoit engagé à travers le Col, et
je n'eus pas de peine à lui faire la réduction, qui étant
faite je sentis un fœtus en travers présentant le ventre.
L'orifice de la Matrice ayant été dilaté par Les
manœuvres de la réduction de ses parois, je tentai
l'introduction de la Main afin de retirer l'enfant;
je fus obligé de porter à plat une Main sur le ventre
de la Malade pour fixer le globe utérin, qui sembloit
fuir lors que je tentois l'introduction de la Main à travers
son Col qui opposoit quelque résistance; je parvins
enfin à faire l'extraction d'un enfant assez volumineux
à Ceterme, et surtout ayant toujours été environné d'une
abondance d'eau.

Je crois qu'il n'est pas bien difficile de rendre raison du
renversement par tout de la Matrice au moment de l'écoulement
des eaux à la suite de l'hydrométrie.

Lors que la Collection d'eau est considérable le fœtus n'a qu'une
pas pour l'ordinaire un volume relatif à son terme, par ce que
le volume d'eau étant considérable empêche une bonne circulation.
L'enfant étant petit alors n'occupe pas un volume relatif —
à l'amplitude des parois de la Matrice, qui n'ont été obligés
de s'étendre que par la présence de l'eau; Mais l'eau venant
à s'évacuer, la Matrice n'étant plus soutenue s'affaisse —
après comme un linge mouillé, et une partie de ses parois
trouvant une issue libre du côté de l'orifice s'engagent
plus ou moins, et peuvent en imposer à ceux qui n'ont pas
assez d'expérience; l'observation suivante concourt à
démontrer de plus en plus la possibilité de ce renversement



3^{me} observation

La femme du portier de l'évêque de cette ville, ayant une grossesse avec très rapidité, parvenue au terme de neuf mois, sentit les eaux se couler sans douleur, l'abondance en fut si grande qu'on ne put reconnaître l'hydrométrie; la sage-femme en pratiquant le toucher, rencontra dans le vagin un corps flottant qu'elle reconnut; plus prudente que celle de l'observation précédente, elle m'envoya chercher; je reconnus facilement la duplicature d'une partie des parois de la Matrice, j'eus mis dans le devoir de faire rentrer la partie sortie, mais l'enfant qui présentait la tête à l'orifice, empêcha la réduction. La Matrice étant tombée dans l'abaissement fut plus de vingt quatre heures à commencer à se replier sur elle-même, à chaque contraction la duplicature des parois engagées entra par la seule élasticité, et dès que le fond de la Matrice fut assez contracté pour comprimer l'enfant, il agit efficacement dessus, et l'accouchement fut très naturel. Je pourrais citer plusieurs observations de renversement d'une partie des parois de la Matrice dans pareil cas, mais je crois l'exposé suffisant, pour qu'on ne puisse douter en avant s'y méprendre.

6^{me} observo

L'application répétée et souvent infructueuse du forceps dans le cas où la tête de l'enfant n'est que faiblement engagée au détroit supérieur du Bassin, — méritent d'être l'attention. L'observation suivante me donne lieu à quelques réflexions à cet égard...

La femme Cebit de la paroisse de Bacilly, âgée d'environ trente ans, bien constituée, devint enceinte peu de temps après son mariage. Cette femme quoiqu'elle dût être d'une taille avantageuse, devint par la fin de sa grossesse d'une si volumineuse, que les

Cuisses et les jambes lui inflèrent, jus qu'au point de faire
soubrouner, ou une grossesse de deux enfans, ou une hydromé-
rie de Matrice; le ventre paroissoit divisé en deux globes très-
distincts; l'un Excedoit les pubis d'environ quatre pouces
et l'autre selevoit dans les regions superieures de l'abdomen; il
y avoit entre ces deux globes un intervalle si sensible, qu'on
eût mis un pain d'une livre entre deux..

parvenue au neuvieme Mois de la grossesse, Elle ressentit
les douleurs préliminaires de l'enfantement. L'orifice de la
matrice se dilata difficilement, quoique bien en face du
vagin; apres deux heures de douleurs l'orifice s'effaca,
les membranes se rompirent spontanément, et les eaux s'écoulèrent,
la pratiquant le toucher la sage femme reconnut le sommet
de la tête d'un enfant qui se presentoit au détroit superieur
du Vagin; Mais voyant qu'il ne s'étoit écoulé que peu d'eau
relativement au volume de la grossesse, voyant en outre
le ventre partagé en deux globes, la sage femme soubrouna
deux enfans dans la Matrice; Dans cette supposition Elle
jugea que l'extension du viscere ayant été portée à un haut
degré, il ne devoit pas y avoir d'abord de douleurs bien
actives; Elle attendit dans l'esperance de voir avancer le
travail en proportion de la gradation des Contractions
uterines; Les douleurs augmentèrent en effet, et le Casque
osseux de la tête de l'enfant s'engagea en forme de sphere
ovoide dans le détroit superieur du Vagin. Cette
forme d'engagement ne plut pas à la sage femme; Cependant
Elle espera qu'à force de Contractions, la Matrice alloit se
débarasser de son fardeau; Mais apres vingt quatre heures
d'un travail assez sérieux, voyant que la tête ne
s'engageoit pas davantage Elle m'en vint chercher

tors que je fus informé de toutes les Circonstances dont
je viens de faire le rapport, je crus que les deux éminences
de l'abdomen étoient des signes non équivoques de la
présence de deux enfans, Mais avant de porter mon



prognostic je voulus être instruit de l'état de la vessie
urinaire. Sur le récit que la malade fit de la facilité avec
laquelle elle urinoit, je ne pus soupçonner la vessie de produire
une de ces éminences; je la soupçonnai d'autant moins que les
deux globes augmentoient en dureté pendant les tranchées, &
qu'il ne se manifestoit alors aucune envie d'uriner. . . .
je me portai donc à croire que la Matrice étoit le siège de ces
deux éminences, & totalement occupée qu'il pouvoit exister deux
individus dans la Matrice, je me persuadai que celui qui se
présentoit au passage étoit retardé dans la progression par
un second, qui faisant compression sur son Corps, lui faisoit
décrire une ligne Courbe de la tête au tronc par la flexion
du Col: préoccupé de cette position, quel parti devois-je
prendre! devois-je attendre que des douleurs plus actives
& plus multipliées eussent déterminé la tête à se dégager
davantage? Il y avoit déjà vingt quatre heures que
la tête étoit dans la même position, dans un travail très
actif l'enfant fait avancer; aussi je ne comptai plus qu'en
les forces de la nature.

Dans l'hypothèse qu'il y eut deux enfans, devois-je
refouler la tête pour terminer l'accouchement par les pieds?
Cette Manœuvre me paroissoit impraticable alors; En effet
une tête déjà engagée, peut être retardée dans sa
progression par la pression d'un second enfant; la Matrice
déjà contractée, & desséchée de ses humidités, comprimant
de plus en plus les Corps sur lesquels elle agissoit, toutes
ces circonstances me faisoient regarder le refoulement de
l'enfant comme impraticable.

Devois-je employer le forceps? la tête étoit-elle assez
engagée pour être saisie favorablement par cet instrument?
J'avois déjà vu appliquer le forceps inutilement dans
de pareilles positions, ainsi je n'osai d'abord opiner en
faveur de l'instrument.
Dans le dédale où j'étois engagé, je me décidai à mettre
la femme dans les positions les plus propres à favoriser

La progression de l'enfant : Deux heures de tranchées violentes
S'élevèrent en ma pressée sans aucun succès. voyant l'insuccès
des positions & des efforts de la nature, je me déterminai à
mettre en usage le forceps, & c. d'autant plus que je craignois
l'inflammation de Matrice.

J'introduisis adroitement les deux branches de l'instrument
l'une après l'autre, le point de leur jonction étoit proche des
grandes lèvres, je crus mon opération favorable, Mais le
forceps revint à vide, & procura une grande Effusion de
Sang du vagin; Cette quaine étoit dure, les fibres rigides,
les vaisseaux engorgés, aussi ne fus-je pas étonné de l'effusion
de Sang qui cessa bientôt de Couler; au contraire je crus
que la rigidité des fibres pourroit faire obstacle à la progression
de l'enfant, & dès que l'instrument avoit procuré la rupture
de quelques uns de ces fibres & le dégorgeement des vaisseaux
je crus-je qu'il en alloit résulter un bien, Mais je me
trompai; la tête resta toujours immobile. Deux heures
après l'application du forceps, quoiqu'infuctueuse, je
proposai encore son Moyen. La femme se livra entièrement
à mes opérations.

La Seconde application de l'instrument
ne fut pas plus favorable que la première; la troisième
fut aussi infructueuse. La femme étoit posée sur
un plan orisonal, mon forceps à ses branches adroitement
allongées & courbées pour saisir une tête, dans quelque
position qu'elle soit; je redoublai toutes mes attentions
pour la quatrième application, Et le forceps revint encore
à vide, alors je laissai reposer la Malade & le soir;
je crus que la tête étoit peu engagée dans le bassin
avoit la facilité de se soulever, & que l'instrument
glissoit dessous sans la saisir. Sous ce point de vue;
je fis approcher la femme sur le bord de son Lit
élevé d'environ trois pieds de terre; la position fut telle
que la tête & la poitrine étoient sur un plan orisonal,
les Cuisses écartées, & les fesses pour ainsi dire en l'air, C'est
à dire qu'elles ne portèrent pas sur le bord du Lit.

j'introduisis alors la premiere branche du forceps sur le plan orizontat, jusqu'à ce qu'elle fût dans le grand bassin, quand elle y fut introduite j'inclinai en bas son extrémité externe, ce qui détermina l'interne à se porter en haut sous les pubis, je fis décrire à la seconde branche la même révolution, et après les avoir unies, je fis l'extraction d'un enfant vivant, du poids de quatorze livres. Son extraction fit disparaître les deux globes, qui avoient — Customement subsisté tant que l'enfant avoit été dans la Matrice, alors le soubson de deux enfans se dissipa, la femme s'est bivée de Capas, sans aucune incommodité — et a accouché depuis fort heureusement.

L'application répétée & infructueuse du forceps dans le Cas ou une tête n'est que faiblement engagée au détroit Supérieur du Bassin, ne parait mériter l'attention.

Ne pourroit-on point attribuer le défaut de Succès au plan orizontat qu'on fait décrire à l'instrument, qui y lisant sous la tête, ne fait que la soulever sans la saisir. ? — Je serois assez porté à le croire, puis qu'ayant fait changer cette ligne de direction à l'instrument après son introduction alternatives des branches, j'ai saisi une tête, qui avoit — été manquée quatre fois, tant que l'instrument avoit — Conservé son plan orizontat.

une observation

une femme avoit accouché Cinq fois avec toute la facilité possible, étant en travail d'enfant pour la sixième fois, Elle Crut en être quitte comme à son ordinaire, Elle se trompa Car l'orifice de la Matrice étoit tellement oblique du côté gauche, qu'elle fut plus de deux heures à se dilater & à se placer en face du vagin. quand l'orifice fut bien en face du vagin & qu'il fut bien dilaté, que les membranes furent rompues, je fus étonné que la tête ne franchît pas le passage, d'autant plus que la femme étoit bien conformée; & que l'enfant n'étoit pas volumineux; La tête étoit —

Engagée de près de quatre pouces dans le petit bassin, sans
donner le moindre signe de progression à chaque tranche'e;
La Malade étoit continuellement tourmentée de douleurs
soudes dans le ventre & dans les reins;
huit heures après l'événement des saurs, voyant l'enfant
toujours dans la même position, dans un accouchement ou tout
annonçait la plus prompte délivrance, je me décidai à le terminer,
à la faveur du forceps je fis la traction d'un enfant qui
avoit trois tours de cordon autour du Col; je n'avois
soubsonné que faiblement cette cause de retardement, attendu
que la tête n'avançoit, ni ne reculoit à chaque douleur...

Quoique l'expérience démontre tous les jours que l'accouchement
s'opère spontanément lors que l'enfant est retarde' par les tours
du cordon autour du Col, attendu que les vaisseaux qui
composent ce lien sont contournés en spirale, et lui permettent
d'acquiescer deux fois le double de la longueur ordinaire; il
paraît que le cordon qui fait le sujet de cette observation
seroit dans le cas de démentir l'expérience, en effet quoique
les vaisseaux du cordon fussent détortillés, lorsque le
cordon ne fut plus que membraneux, l'accouchement ne
s'en opéroit pas pour cela davantage.

Ce qui pourroit être ici un cas d'exception, c'est que le
placenta étoit tellement implanté dans le côté droit
de la Matrice, qu'il faisoit décrire au cordon un angle
obtus, en partant du Col de l'enfant au point de son
implantation au placenta.

Lors que les Contractions uterines agissoient sur le Corps
de l'enfant, la portion du cordon répondante au Col
se trouvoit seule tirillée, et tout l'effort se perdoit dans
l'angle, sans se faire sentir à la portion répondante au
placenta; Ceci étaye mon assertion, c'est que si le
placenta eût été tirillé par le cordon, il auroit fait
ceder la paroi de la Matrice à laquelle il étoit implanté,
et le placenta n'auroit pas conservé une adhérence si
intime; Car j'eus obligé de le détacher avec la main
moyant pu le faire à la faveur du cordon



Mr Levret dans son Mémoire sur la manière de délivrer,
fait voir que souvent la difficulté d'extraire le placenta
vient de l'angle formé par le Cordon.
Si je n'eusse pas pris le parti du forceps dans un accouchement
où tout ~~devoit~~ ~~annonçoit~~ un heureux succès, je me serois
carté des principes de Mr purgea, et l'enfant auroit sans
doute péri apoplectique, la face étoit violette, ~~annonçoit~~
Ceyui annonçoit l'engorgement des vaisseaux du Cerveau,
Les vaisseaux du Cordon étoient tous détortillés, ne pouvoient
plus prêter, et l'angle du Cordon subsistait toujours.
L'enfant étoit dans le plus grand danger, mais grâce
au forceps il jouit d'une bonne santé...

5^{me} observation

La femme giron de la paroisse de Morcé, avoit
accouché deux fois avec assez de facilité; devenue
enceinte pour la troisième fois, Elle ressentit une grosseur
dans le vagin, qui souvent excédoit la vulve; Cette grosseur
n'étoit que médiocre dans le commencement de son apparition,
qui fut environ le sixième mois de grossesse, Mais sur
la fin Elle augmenta considérablement; Cependant Elle
rentrait facilement quand la femme étoit couchée la
compressoit; Enfin la femme étoit dans les douleurs
de l'enfantement, Cette tumeur se précipita au delà
des grandes lèvres, et étoit plus volumineuse que la tête
d'un enfant; Sa couleur étoit d'un violet foncé, on
observoit à son Centre un orifice. La sage femme
fut effrayée, et crut que c'étoit la matrice qui se
précipitoit. Les membranes étoient rompues, Le
Sommet de la tête étoit approché d'environ trois pouces
de l'orifice de cette tumeur, la sage femme tenta
la dilatation de l'orifice en y introduisant ses doigts
fermés, et en les écartant ensuite en forme de dilatateur,
Elle travailla inutilement pendant long temps, car le
Dourclel augmentoit de grosseur pendant la tranchée
et l'orifice se resserroit davantage. Il y avoit environ

Deux heures que Les choses étoient en Cet état quand j'arrivai
aupres de la malade. je reconnus que Cette tumeur n'étoit
autrè chose qu'un renversement total du vagin, je jugeai
que puis que l'orifice n'avoit point Cédé Depuis pres de deux
heures, ni à la dilatation graduée des doigts, ni à la
pression de la tête lors des douleurs, qu'en contraindre Cet
orifice se resserroit lors des douleurs, je jugeai d'opie qu'il
y auroit du danger à abandonner d'avantage l'accouchement
à la nature, D'autant plus digne que la tête excedoit par
son sommet la sortie des os du bassin à son détroit inférieur.

mais quel parti prendre? puis que les tentatives qui
avoient réussi à Mr Mauriceau dans une pareille
Circoustance, avoient été infructueuses? n'ayant
vu dans aucun auteur de Circoustance semblable,
je me decidai pour l'application du forceps. je
doutai d'abord de la possibilité de son introduction,
Ces fois la douleur l'orifice n'avoit pas plus de trois
pouces de Circonférence, et dans la douleur il se
resserroit pres que entièrement; Comptant nean moins
sur le que la texture du vagin lui permet une ample
dilatation, je ne doutai pas que Cette guaine ne permit
l'usage du forceps; En effet j'introduisis assez facilement
la premiere branche, en forçant un peu à l'entrée de
l'orifice, hors la douleur; l'introduction de la seconde
branche ne fut pas plus difficile que la premiere, à
la faveur de Cet instrument je saisi parfaitement
la tête; je fis soulever le bourrelet par deux mains
appliquées sur les Côtés, et je fis l'extraction d'un
enfant qui n'étoit pas tres volumineux, le vagin reentra
Comme par ressort peu de temps apres l'accouchement
et la femme se porta bien
Si per son ne avant moi n'a encore démontré l'avantage
du forceps dans la descente Complète du vagin, je
me félicite de l'avantage que l'ait peut retirer
de Cet instrument en pareil Cas Lors de l'enfantement.

9^{me} observation

une femme de petite stature étant dans les douleurs de l'enfantement, fut atteinte d'une Cistocèle vaginale; La vessie proéminoit au dehors des grandes lèvres d'environ la grosseur d'un œuf de poule, proche le méat urinaire, — cette hernie étoit tendue comme un ballon & étoit rangée de manière à représenter une poire de bon chetien, La sage femme crut d'abord que cette tumeur n'étoit autre chose que la poche des membranes chorion & amnios, & se mit en devoir de la percer avec son doigt; Mais reconnoissant bientôt la Méprise, Elle m'en vint chercher. Des que j'eus arrivé je n'eus pas de peine de reconnoître la vessie par le rangement de ses fibres; je glissai deux doigts par dessous la Cistocèle, & reconnus que l'orifice de la Matrice étoit dilaté, que les membranes étoient rompues, que la tête de l'enfant étoit en partie engagée dans le vagin; tout étant ainsi disposé, je Craignis que la tête venant à franchir brusquement n'eût occasionné une Crevasse à la poche urinaire, & pour parer à cet inconvénient j'y fis la ponction avec la pointe d'une des branches de mes Ciseaux, il sortit peu d'urine, mais la tumeur s'affaissa; l'enfant ne tarda pas à franchir le passage, & la poche urinaire ne tarda pas à rentrer d'elle même, Car quand j'eus pu en faire la réduction Elle avoit disparu.

Étant pourvu de trois quarts, je préférerais pour faire la ponction la branche de Ciseaux à la lancette, Car la branche de Ciseaux écarte plutôt les fibres qu'elle ne les coupe, & la lancette les coupe plutôt qu'elle ne les écarte. Et on doit toujours préférer tout ce qui peut tendre à une meilleure fin

Jourbault Chirurgien à Arranches

Correspondant de l'Académie royale de Chirurgie de Paris — à Arranches Le 12 May 1789

Ms. 5.1.1